

Wanneer krijg je de uitslag?

Bij de VIA- methode kan er meteen gezien worden of er een afwijking is en de uitslag kan gelijk aan de vrouw doorgegeven worden.

Hoe betrouwbaar is de uitslag ?

De uitslag van VIA is hoog; 70-80 % van de afwijkingen worden bij het eerste onderzoek ontdekt. Bij regelmatige (jaarlijkse) controle is er voldoende garantie dat eventuele afwijkingen worden opgespoord. Men **kan** genezen als er tijdig behandeld wordt.

Hoe vaak moet VIA- onderzoek worden gedaan?

Stichting Lobi adviseert om het onderzoek door middel van VIA eenmaal per jaar te doen.

Wat als de uitslag goed is?

Bij VIA onderzoek is het mogelijk meteen tot behandeling over te gaan. Als het onderzoek uitwijst dat er afwijkingen zijn, zal de dokter/ verpleegkundige uitleggen welke behandeling mogelijk is.

Kosten van een VIA Onderzoek .

Wij hebben een samenwerking met de zorgverzekeraars.

Assuria, Self Reliance, Parsasco en SZF vergoeden de kosten van een VIA Onderzoek. Voor SZF heeft u wel een garantie of lab brief nodig naast uw pasje. Indien u niet verzekerd bent kunt u ook de kosten zelf betalen.

Let wel !

Vrouwen met ongewone buikpijn en/of abnormaal vaginaal bloedverlies kunnen na consultatie bij de verpleegkundige of arts advies krijgen over de meest geschikte onderzoeksmethode. Voor vrouwen met deze klachten is vaak nog aanvullend onderzoek nodig naast het onderzoek

U kunt bij Stichting Lobi ook terecht voor :

Pil, Prikpil, Condoom (mannen en vrouwen)
Spiraal (inbrengen, controle en verwijderen)
Emergency contraceptive (Morning after pill)
Baarmoederhalskanker onderzoek (Papsmear of VIA), Borst onderzoek, Prostaat onderzoek
HIV-test + counseling
Familyplanning voor HIV+ koppels
Gonorrhoe en Chlamydia onderzoek (SOA)
Fluoranalyse, Kinderwens begeleiding,
Sperma analyse, Zwangerschapstest,
Intra Uterine Inseminatie,
Echografie (Zwangerschap en spiraal controle)
Bloedsuikertest (Glucose onderzoek)
Cholesterol test, Bloeddrukmeting
Counselingsgesprek, Consult bij de arts
Educatie & training



STICHTING LOBI

- Paramaribo : Fajalobistraat # 16 tel.: 400444
- Lelydorp : Fajalobilaan # 103 tel.: 367227
- Nickerie : Bharosstraat # 44 tel.: 231533
- Website : www.lobisuriname.org
- E-mail : lobi@lobi.sr
lobi@lobisuriname.org



Meer over cervix screening

VIA - Methode

*Preventie van en onderzoek naar
baarmoederhalskanker*

*Vrouwen van wie de
baarmoeder is verwijderd
hoeven géén cervix screening meer
te doen.*



Baarmoederhalskanker is te voorkomen. Onderzoek kan helpen te ontdekken of er veranderingen of afwijkingen in de baarmoeder zijn, die tot baarmoederhalskanker kunnen leiden. Hierdoor kunnen voorstadiën van kanker op tijd worden ontdekt. Deze afwijkingen kunnen voor 100% genezen als er tijdig behandeld wordt.

Onderzoek naar baarmoederhalskanker wordt ook cervix screening genoemd.

Wanneer zou u moeten beginnen met een cervix screening?

- Als u al minimaal 3 jaren seksueel actief bent (ongeacht uw leeftijd)
- Als u al 21 jaar of ouder bent en nooit eerder een cervix screening heeft gedaan(dit onderzoekje is niet aangeraden bij vrouwen die nog geen seks hebben)

Er zijn nu twee screenings – methoden voor Baarmoederhalskanker onderzoek bij Stichting Lobi mogelijk.

1. Uitstrijkje ofwel de papsmear
2. VIA (Visual Inspection with Acetic Acid)

DE VIA- METHODE

Bij VIA wordt door een (getrainde) verpleegkundige of dokter de baarmoedermond nat gemaakt met behulp van een watje met een verdunde azijnzuuroplossing en na 1 minuut met het blote oog bekeken en beoordeeld.




Bij het onderzoek wordt het speculum ingebracht, zodat de baarmoedermond goed te zien is.



Bij VIA wordt met de baarmoedermond met een azijnzuuroplossing natgemaakt en daarna met het blote oog bekeken.

De methode is gebaseerd op de eigenschap dat abnormaal weefsel van kleur verandert als het in contact wordt gebracht met azijnzuur.



Is VIA – onderzoek pijnlijk?

Nee, VIA-onderzoek is niet pijnlijk. Het inbrengen van het speculum - ook wel eendebek genoemd- kan als je te gespannen bent wat gevoelig zijn. Het onderzoek kan ook iets pijnlijker zijn als er al een bestaande pijnlijke aandoening is. Misschien prikkelt het even bij het natmaken van de baarmoedermond.

Het speculum, ook wel eendebek genoemd.



Wanneer is de beste tijd om een VIA-onderzoek te laten doen?

De vrouw moet niet menstrueren op het moment dat de VIA wordt gedaan. Twee weken nadat de menstruatie is gestopt, is de beste tijd om het onderzoek te laten doen. Verder moet de vrouw geen vaginale medicatie gebruiken in de periode van het onderzoek.